

Transition entre ancien et nouveau calendrier vaccinal 2013

Le principe général est de se recalculer le plus rapidement sur le nouveau calendrier.

► Chez le nourrisson, l'enfant et l'adolescent

Pour tout nourrisson, enfant et adolescent ayant déjà reçu un ou des vaccins avant la mise en place de ce nouveau calendrier vaccinal, le tableau ci-dessous précise les conditions de poursuite de la vaccination.

PÉRIODE DE TRANSITION AVEC LES ADMINISTRATIONS EFFECTUÉES ANTÉRIEUREMENT										
Transition		ADULTE								
		2 mois	3 mois	4 mois	11 mois	16-18 mois	6 ans	11 - 13 ans	16-18 ans	25 ans
Dernière injection effectuée selon le calendrier vaccinal 2012	Poursuite selon le nouveau calendrier vaccinal 2013	DTCaPHib VHB		DTCaPHib VHB	DTCaPHib VHB		DTCaP	dTcaP		dTcaP
		DTCaPHib VHB	DTCaPHib VHB	DTCaPHib VHB	*DTCaPHib VHB		DTCaP	dTcaP		dTcaP
		DTCaPHib VHB	DTCaPHib VHB	DTCaPHib VHB	*DTCaPHib VHB		DTCaP	dTcaP		dTcaP
		DTCaPHib VHB	DTCaPHib VHB		DTCaPHib VHB		DTCaP	dTcaP		dTcaP
							dTP/ dTcaP**	DTCaP		dTcaP
							DTCaP**	dTcaP		dTcaP
								DTCaP/ dTcaP		dTcaP
									dTP/dTcaP	dTcaP

* L'intervalle minimal entre la 3^e dose et ce rappel doit être de six mois - ** Hors recommandation précédente

D: Diphtérie dose entière d'anatoxine, d: diphtérie dose réduite d'anatoxine – Ca: Coqueluche acellulaire dose entière d'antigènes coquelucheux, ca: coqueluche acellulaire dose réduite d'antigènes coquelucheux. – T: Tétanos – P: Poliomyélite – Hib: *Haemophilus influenzae* de type b – VHB: Hépatite B

Exemples :

- ◆ Chez un nourrisson ayant déjà reçu les 3 doses de la primovaccination à un mois d'intervalle, il convient d'administrer le rappel à l'âge de 11 mois et de poursuivre avec le nouveau schéma. L'intervalle minimal entre la 3^e dose et le rappel doit être de six mois (ligne 3).
- ◆ Les enfants ayant déjà reçu un vaccin dTP (ou un dTcaP) à l'âge de 6 ans recevront un vaccin DTCaP entre 11 et 13 ans (ligne 5). Les enfants ayant reçu un DTCaP à l'âge de 6 ans recevront un dTcaP entre 11 et 13 ans (ligne 6).



2013 calendrier simplifié des vaccinations

Âge approprié	Naissance	2 mois	4 mois	11 mois	12 mois	16-18 mois	6 ans	11-13 ans	14 ans	25 ans	45 ans	65 ans et +
BCG												
Diphtérie-Tétanos-Poliomyélite												Tous les 10 ans
Coqueluche												
Haemophilus influenzae de type b (Hib)												
Hépatite B												
Pneumocoque												
Méningocoque C												
Rougeole-Oreillons-Rubéole												
Papillomavirus humain (HPV)												
Grippe												Tous les ans