# Lac de Fenestre 10/07/2014

## Thym serpolet. thymus serpyllum

#### Famille des lamiacées

**Fleurs:** Roses à lilas (5mm); en têtes.Calce velu, à lèvre sup. tridentée; l'inferieure à 2 pointes. Corolle à2 lèvres inégales

**Feuilles:** Ovales à lancéolées , glabres ou pubescentes. Opposées et à pétiole généralement cilié.

**Fruits:** 4 petits carpelles ovales et lisses, inclus au fond du calice.

**Vivace.** 5-50 cm Avril-Septembre 500-3000m



## Saxifrage sillonné. Saxifraga exarata

#### Famille des saxifragacées.

Fleurs: Blanc jaunâtre (0.5-1 cm) en panicules lâches, sépales oblongs, pétales oblongs, intercalées entre les sépales.

**Feuilles:** En rosette dense, trilobée au sommet (rarement à 4-5 lobes). Feuilles inf. à face sup. à sillons.

**Fruits:** Capsules ovales à cornes divergentes.

**Vivace.** 5-15 cm Mai – Août 1400-3000m



## Raiponce du Piémont. Phyteuma globularifolium

#### Famille des campanulacées.

**Fleurs:** Bleu foncé; en petites têtes globuleuses (1-1.5 cm),5-6 fleurs. Bractées larges, ovales,+- obtuses et ciliées.

**Feuilles:** En rosette, ovales à oblongues ou spatulées (1-1.5 cm). Feuilles sup. plus étroites. Atténuées en pétiole.

Fruits: Capsules globuleuses.

**Vivace.** 2-8 cm. Juin-Août 1700-2700 m

Peu commun



## Raiponce à feuilles de bétoine. Phyteuma betonicifolium

#### Famille des campanulacées.

**Fleurs:** Bleues ; en tête ovoïde à cylindrique (2-10 cm) en fin de floraison. Bractées petites, linéaires.

**Feuilles:** Feuilles inf. oblongues-lancéolées +- crénelées, dentées, à base tronquée et à long pétiole. Feuilles sup. sessiles et linéaires.

**Fruits:** Capsules globuleuses. **Vivace.** 20-70 cm Juin- Août.

1400-2400 m



## Grassette à éperon grêle. Pinguicula leptoceras

#### Famille des orobanchacées.

**Fleurs:** Bleues à violet foncé (1.5-2.5 cm) à taches blanches nettes à la gorge; solitaires. Corolle à lobes inf. chevauchants. Eperon court.

**Feuilles:** En rosette, ovales à oblongues, à bords irrégulièrement enroulés vers le dessus; vert pâle. Collantes (pour piéger les insectes; plante carnivore)

Fruits: Capsule sphériques.

Vivace. 5-15 cm Juin- août.

600-2600 m



## Œillet négligé. Dianthus pavonus

### Famille des Caryophyllacées.

Fleurs: Rouges à roses (2-2.5 cm); solitaires. Calice court et +- strié. Pétales crénelés à gorge +- poilue. Bractées lancéolées, aiguës, égalant le calice.

Feuilles: Linéaires (1-2 cm) et

aiguës. Opposées..

Vivace. 5-20 cm Juillet- Août

1500-2700 m



## Achillée erba-rotta. Achillea erba-rotta.

#### Famille des astéracées.

**Fleurs:** Blanches, les ligulées peu nombreuses; en capsules réunis en corymbe lâche. Bractées obtuses.

**Feuilles:** Oblongues. Feuilles inf. en rosette, crénelées dans le haut, rétrécies en pétiole; feuilles sup. dentées tout autour. Toutes sessiles.

**Fruits:** Akènes comprimés oblongs

**Vivace.** 5-30 cm Juillet-Août 1800-3000 m



## Bugle pyramidale. Ajuga pyramidalis

#### Famille des lamiacées.

**Fleurs:** Bleues à roses (1.5-2 cm); en épi pyramidal. Calice velu. Corolle à lèvre inf. à 3 lobes. Bractées foliacées, rougeâtres, grandes et entières

**Feuilles:** Ovales, entières ou crénelées; +-velues. Feuilles inf. plus grandes. Toutes pétiolées et opposées.

**Fruits:** 4 petits carpelles ovoïdes, inclus au fond du calice.

Vivace. 5-20 cm Mai- Août.

1300-2700 m

