

Plateau de Dina 12/06/2014

# Leuzée conifère. *Rhaponticum coniferum*

- **Famille des astéracées.**
- **Flours:** Pourpres; en capitule similaire à un cône de conifère (3-6 cm), solitaire. Bractées scarieuses, à large sommet ovale, brun clair, et lacéré.
- **Feuilles:** Pennées, à segments presque linéaires; blanches-tomenteuses dessous.
- **Fruits:** Akènes ovoïdes, brun et ridés, à longue aigrette plumeuse.
- **Vivace.** 5-30 cm.
- **Fleuraison:** Mai juillet. De 0-1500 m



# Amanitopsis vaginata. Amanita mairei.

## *Grisette, coucoumelle.*

- **Famille des amanites.**
- Cette amanite d'aspect élancé, fragile, se reconnaît facilement à son absence d'anneau et aux stries du chapeau. Sa couleur est très variable: grise, brune, blanche, orangée, argentée, fauve.
- Pied long, plus ou moins zébré, blanc ou légèrement coloré.
- Comestible, mais peu charnu et peu parfumé. Sans intérêt culinaire.



# Lis turban. *Lilium pomponium*

- **Famille des liliacées.**
- **Fleurs:** Rouge orangé (3-5 cm)+/- ponctuée de sombre; solitaire ou par 2-6, pendantes. 6 tépales enroulés.
- **Feuilles:** Linéaires (5-12 cm). Feuilles inf. nombreuses et plus larges. Toutes alternes.
- **Fruits:** Capsules trigones.
- **Vivace.** 25-80 cm
- **Fleuraison:** mai juin
- de 200 à 2000 m
- **Peu commun et très protégé**



# Zygènes trifolli butinant un chardon à capitules denses.

- **Famille des zygaenides**
- Papillons de taille moyenne (25-35mm d'envergure) au corps lourd souvent de couleur vive.
- **Chardon à capitules denses. *Carduus pycnocephalus***
- **Famille des astéracées.**
- **Fleurs:** Pourpres; en petits capitules cylindriques (+/- 1 cm), sessiles et groupés par 2-5. Bractées à pointe épineuse, arquée. Décurrentes.
- **Feuilles:** Découpées à pennées, en segments épineux: blanches-tourmenteuses dessous. Décurrentes
- **Fruits:** Akènes oblongs-linéaires, lisses, à aigrette.
- Annu.ou Bisann. 20-120 cm Avril août de 0-1000m

