

Date : Observateur :
Commune : Lieu : GPS :

Liste des espèces observées



- La large Hespérie, *Astraptus anaphus anausis* (Godman&Salvin, 1896)
 - L'Hespérie verdâtre sans queue, *Astraptus talus* (Cramer, 1777)
 - L'Hespérie du Canna, *Calpodus ethlius* (Hübner, 1819)
 - L'Hespérie à taches orange, *Epargyreus zestos* (Geyer, 1832)
 - L'Hespérie orangée grise, *Hylephila phyleus* (Drury, 1773)
 - L'Hespérie brun-beige à tache carrée, *Nyctelius nyctelius agari* (Dillon, 1947)
 - L'Hespérie brun-beige à tache sagittée, *Panoquina lucas* (Skinner, 1891)
 - L'Hespérie du bord de mer, *Panoquina panoquinoides* (Skinner, 1891)
 - L'Hespérie bleutée, *Polygonus savigny* (Latreille, 1824)
 - L'Hespérie élancée, *Proteides mercurius angasi* (Godman&Salvin, 1884)
 - L'Hespérie gris-clair, *Pyrgus orcus* (Stoll, 1780)
 - L'Hespérie à queues courtes, *Urbanus obscurus* (Hewitson, 1867)
 - L'Hespérie à queues longues, *Urbanus proteus domingo* (Scudder, 1872)
 - L'Hespérie orange, *Wallengrenia ophites* (Mabille, 1878)
-
- La Thécla bleu-gris, *Allosmaitia piplea* (Godman&Salvin, 1896)
 - La Thécla verte, *Chlorostymon simaethis* (Drury, 1773)
 - La Thécla brune, *Electrostymon angerona* (Godman&Salvin, 1896)
 - L'Argus minuscule, *Hemiargus hanno* (Stoll, 1790)
 - L'Argus gris clair, *Leptotes cassius* (WCramer, 1775)
 - La Lycène sans queue, *Strymon bubastus* (Stoll, 1780)
-
- Le Nacré américain, *Agraulis vanillae* (Linné, 1758)
 - Le Nymphale cendré, *Anartia jatrophae* (Linné, 1763)
 - Le Monarque, *Danaus plexippus* (Linné, 1758)
 - Le Flambé, *Dryas iulia* (Fabricius, 1775)
 - Le Nymphale du Bois-Canon, *Historis odius* (Fabricius, 1775)
 - Le Nymphale brun, *Junonia evarete* (Cramer, 1779)
 - Le Nymphale brun des mangroves, *Junonia genoveva* (Cramer, 1780)
 - La Feuille morte des bois de Campêche, *Memphis dominicana luciana* (Hall, 1929)
-
- La Piéride jaune à deux tons, *Aphrissa statira statira* (Cramer, 1777)
 - La Piéride blanc lustré, *Appias drusilla* (Cramer, 1777)
 - La « Piéride du chou » antillaise, *Ascia monuste* (Linné, 1764)
 - Le « Soufré » à trait arqué, *Eurema daira* (Cramer, 1777)
 - Le « Soufré » bicolore des Antilles, *Eurema venusta* (Boisduval, 1836)
 - La Piéride orangée, *Phoebis agarithe* (Boisduval, 1836)
 - La Piéride jaune, *Phoebis sennae* (Linné, 1758)
-
- Le Castnia du Père Pinchon, *Castnia pinchoni* Pierre, 2003
-
- Le Papillon des Petites-Antilles, *Battus polydamas* (Linné, 1758)
 - Heraclides androgeus* (Cramer, 1775)
-
- Autres espèces :
Migratrices ou disparues
- Le Diadème, *Hypolimnas misippus* (Linné, 1764)
 - La Belle-dame, *Vanessa cardui* (Linné, 1758)
 - Le Flambeau nacré, *Dione juno* (Cramer, 1779)



Date : Observateur :
Commune : Lieu : GPS :

Liste des espèces observées

- La large Hespérie, *Astraptus anaphus anausis* (Godman&Salvin, 1896)
 - L'Hespérie verdâtre sans queue, *Astraptus talus* (Cramer, 1777)
 - L'Hespérie du Canna, *Calpodus ethlius* (Hübner, 1819)
 - L'Hespérie à taches orange, *Epargyreus zestos* (Geyer, 1832)
 - L'Hespérie orangée grise, *Hylephila phyleus* (Drury, 1773)
 - L'Hespérie brun-beige à tache carrée, *Nyctelius nyctelius agari* (Dillon, 1947)
 - L'Hespérie brun-beige à tache sagittée, *Panoquina lucas* (Skinner, 1891)
 - L'Hespérie du bord de mer, *Panoquina panoquinoides* (Skinner, 1891)
 - L'Hespérie bleutée, *Polygonus savigny* (Latreille, 1824)
 - L'Hespérie élancée, *Proteides mercurius angasi* (Godman&Salvin, 1884)
 - L'Hespérie gris-clair, *Pyrgus orcus* (Stoll, 1780)
 - L'Hespérie à queues courtes, *Urbanus obscurus* (Hewitson, 1867)
 - L'Hespérie à queues longues, *Urbanus proteus domingo* (Scudder, 1872)
 - L'Hespérie orange, *Wallengrenia ophites* (Mabille, 1878)
-
- La Thécla bleu-gris, *Allosmaitia piplea* (Godman&Salvin, 1896)
 - La Thécla verte, *Chlorostymon simaethis* (Drury, 1773)
 - La Thécla brune, *Electrostymon angerona* (Godman&Salvin, 1896)
 - L'Argus minuscule, *Hemiargus hanno* (Stoll, 1790)
 - L'Argus gris clair, *Leptotes cassius* (WCramer, 1775)
 - La Lycène sans queue, *Strymon bubastus* (Stoll, 1780)
-
- Le Nacré américain, *Agraulis vanillae* (Linné, 1758)
 - Le Nymphale cendré, *Anartia jatrophae* (Linné, 1763)
 - Le Monarque, *Danaus plexippus* (Linné, 1758)
 - Le Flambé, *Dryas iulia* (Fabricius, 1775)
 - Le Nymphale du Bois-Canon, *Historis odius* (Fabricius, 1775)
 - Le Nymphale brun, *Junonia evarete* (Cramer, 1779)
 - Le Nymphale brun des mangroves, *Junonia genoveva* (Cramer, 1780)
 - La Feuille morte des bois de Campêche, *Memphis dominicana luciana* (Hall, 1929)
-
- La Piéride jaune à deux tons, *Aphrissa statira statira* (Cramer, 1777)
 - La Piéride blanc lustré, *Appias drusilla* (Cramer, 1777)
 - La « Piéride du chou » antillaise, *Ascia monuste* (Linné, 1764)
 - Le « Soufré » à trait arqué, *Eurema daira* (Cramer, 1777)
 - Le « Soufré » bicolore des Antilles, *Eurema venusta* (Boisduval, 1836)
 - La Piéride orangée, *Phoebis agarithe* (Boisduval, 1836)
 - La Piéride jaune, *Phoebis sennae* (Linné, 1758)
-
- Le Castnia du Père Pinchon, *Castnia pinchoni* Pierre, 2003
-
- Le Papillon des Petites-Antilles, *Battus polydamas* (Linné, 1758)
 - Heraclides androgeus* (Cramer, 1775)
-
- Autres espèces :
Migratrices ou disparues
- Le Diadème, *Hypolimnas misippus* (Linné, 1764)
 - La Belle-dame, *Vanessa cardui* (Linné, 1758)
 - Le Flambeau nacré, *Dione juno* (Cramer, 1779)



Fiche de terrain

