





Critères de distinction entre la Fouine et la Martre

		Fouine	Martre
Critère	Fiabilité	<i>Martes foina</i> Erxleben, 1777	<i>Martes martes</i> Linnaeus, 1758
			
Couleur générale	Critère peu fiable	Gris-brun (ensemble plutôt pâle)	Brun -foncé / marron
Poil de bourre	Excellent	Clair	Foncé
Plastron	Critère moyen	Variable en forme mais généralement blanc	Variable en forme, mais généralement jaune-orangé
Truffe	Critère non constant chez la martre	Rose	Sombre
Pilosités plantaires	Critère non constant chez la martre	Absente	Développée (effacent les contours des traces)
Empreinte	Critère peu fiable	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Patte antérieure droite (doigt interne et pelote carpienne peuvent ne pas marquer) Traces de la fouine plus réduite que celle de la martre (ici grandeur nature) ATTENTION les empreintes de ces deux espèces sont très similaires </div>	
			
Rangée dentaire supérieure Pm = prémolaires	Excellent	Face externe Pm3 convexe  Lobe interne Pm4 réduit	Face externe Pm3 concave  Lobe interne Pm4 plus développé

Mais aussi :

La fouine apparaît plus svelte que la martre sur le terrain. Son museau est aussi plus massif, et sa queue moins fournie.

Conseils :

- Privilégiez l'addition de plusieurs critères pour un meilleur diagnostic.
- En cas de doute, ne pas hésiter à fournir le maximum d'éléments en commentaire, de sorte que le comité de validation puisse statuer le plus précisément.
- Les photos seront toujours des documents précieux, à privilégier dans le cas de données relatives à des animaux morts (ex : collisions routières).

Sources :

M. Labrid (1986). Encyclopédie des carnivores de France. La Martre. SFPEM.
 R. Libois & A. Waechter (1991). Encyclopédie des carnivores de France. La Fouine. SFPEM.
 P. Bang & P. Dahlström (1996). Guide des traces d'animaux. Delachaux & Niestlé