



**LENVAL**

Agir pour l'enfance,  
pour le futur

Zambon

sanofi

AGIR à dom.  
SOCIÉTÉ À MISSION

arard  
ASSOCIATION POUR LA SANTÉ & LE DÉVELOPPEMENT DE L'ENFANCE

DANONE  
NUTRITION  
SPECIALISÉE  
blédina Gallia NUTRICIA

MSD

LABORATOIRES  
Guigoz

NEURAXPHARM

nhc  
LE PARTENAIRE AU CŒUR  
DE VOTRE ENFANCE

Laboratoires  
Novalac  
LES ROUTES DES PARENTS  
MÉRIENT DES RÉPONSES D'EXPERTS

ponipom  
LA SANTÉ EN LA MAISON



# Du nouveau dans la prévention des infections invasives à Méningocoques



■ 100 minutes de pédiatrie  
(05/06/2025)

■ Dr HAAS FERRUA Olivier

RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

Santé  
publique  
France



**Méningocoque B**

Les 5 bonnes raisons de se faire vacciner

# INFECTIONS INVASIVES A MENINGOCOQUES





France : une **recrudescence préoccupante** depuis 2022 :

**2023: 560 cas, dont 44 % sérogroupe B**

**2024 : 616 cas, le plus élevé depuis 2010**

**Taux d'incidence des cas déclarés d'IIM en 2024 : 0,9 pour 100 000 habitants**

Evolution des IIM par sérogroupe en France,  
janvier 2017- Février 2025 (par année épidémiologique : Juillet-Juin)



# INCIDENCE DES IIM France 2024





Figure 4. Taux d'incidence annuels des cas déclarés des infections invasives à méningocoque liées aux principaux sérogroupes, France, 2000-2024





**Tableau 2. Nombre de cas d'IIM et taux d'incidence des cas déclarés pour 100 000 habitants en France en 2024 pour l'ensemble des cas déclarés et selon les principaux sérogroupes**

| Classe d'âge | Total IIM |                       | IIM B  |                       | IIM W  |                       | IIM Y  |                       |
|--------------|-----------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|-----------------------|
|              | Nb cas    | Taux pour 100 000 hab | Nb cas | Taux pour 100 000 hab | Nb cas | Taux pour 100 000 hab | Nb cas | Taux pour 100 000 hab |
| < 1an        | 54        | 8,5                   | 28     | 4,4                   | 17     | 2,7                   | 6      | 0,9                   |
| 1-4 ans      | 49        | 1,7                   | 28     | 1,0                   | 17     | 0,6                   | 2      | 0,1                   |
| 5-14 ans     | 41        | 0,5                   | 24     | 0,3                   | 5      | 0,1                   | 7      | 0,1                   |
| 15-24 ans    | 114       | 1,4                   | 67     | 0,8                   | 9      | 0,1                   | 28     | 0,3                   |
| 25-59 ans    | 169       | 0,6                   | 76     | 0,3                   | 53     | 0,2                   | 29     | 0,1                   |
| 60-79 ans    | 110       | 0,7                   | 30     | 0,2                   | 34     | 0,2                   | 40     | 0,3                   |
| ≥ 80 ans     | 79        | 1,9                   | 16     | 0,4                   | 31     | 0,7                   | 29     | 0,7                   |
| Total        | 616       | 0,9                   | 269    | 0,4                   | 166    | 0,2                   | 141    | 0,2                   |



Tableau 3. Nombre de cas et de décès pour l'ensemble des IIM et pour les principaux sérogroupes en France en 2024

| Classe d'âge | Total IIM |              | IIM B  |                                                                                                                                                     | IIM W  |           | IIM Y  |          |
|--------------|-----------|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|----------|
|              | Nb cas    | Nb décès (%) | Nb cas | Nb décès                                                                                                                                            | Nb cas | Nb décès  | Nb cas | Nb décès |
| < 1 an       | 54        | 3 (6 %)      | 28     | <div>Purpura fulminans rapporté pour 98 cas (16 %).<br/>20 % pour les IIM B,<br/>15 % pour les IIM W,<br/>6 % pour les IIM Y<br/>(p&lt;0,001)</div> |        |           |        | 0        |
| 1-4 ans      | 49        | 3 (6 %)      | 28     |                                                                                                                                                     |        |           |        | 0        |
| 5-14 ans     | 41        | 4 (10 %)     | 24     |                                                                                                                                                     |        |           |        | 0        |
| 15-24 ans    | 114       | 7 (6 %)      | 67     |                                                                                                                                                     |        |           |        | 1        |
| 25-59 ans    | 169       | 14 (8 %)     | 76     |                                                                                                                                                     |        |           |        | 2        |
| 60-79 ans    | 110       | 16 (15 %)    | 30     | 8                                                                                                                                                   | 34     | 6         | 40     | 2        |
| ≥ 80 ans     | 79        | 22 (28 %)    | 16     | 8                                                                                                                                                   | 31     | 8         | 29     | 6        |
| Total        | 616       | 69 (11 %)    | 269    | 32 (12 %)                                                                                                                                           | 166    | 26 (16 %) | 141    | 11 (8 %) |

Note : 33 cas avec évolution non renseignée considérés comme non décédés


- Introduction dans le calendrier vaccinal des 2022.
- Vaccination recommandée en schéma à 3 doses (3, 5 et 12 mois) et peut être initiée jusqu'à l'âge de 2 ans.
- 1ère cohorte de naissance ciblée par ces recos (nés en 2022) :
  - CV estimée à 48,8 % pour au-moins une dose à l'âge de 8 mois et à 35,1 % pour les trois doses à l'âge de 21 mois.
- Enfants nés en 2023: CV estimée à 74,7 % pour au-moins une dose à l'âge de 8 mois (données au 31 décembre 2023)

La totalité des cas d'IIM B chez les enfants < 2 ans en 2023 et 2024 ont concerné des enfants non ou incomplètement vaccinés.

Aucun échec vaccinal identifié chez les nourrissons après un schéma complet de vaccination.

Incidence des IIM B a diminué en 2024 vs 2018-2019 chez les enfants < 2 ans : impact positif probable de la vaccination contre le méningocoque B recommandée aux nourrissons depuis 2022.

Incidence augmentée chez les adultes en 2024



# Recommandations et obligations en 2025



# Recommandations et obligations en 2025



# Recommandations et obligations en 2025

ENFIN !!!

Clarifications majeures du programme de prévention des IIM :

## Méningocoques ACWY :

### ✓ **Obligation vaccinale jusqu'à 24 mois :**

Schéma habituel : **6 mois puis 12-13 mois** et ratrapage jusqu'à 2 ans (1 dose) même si vaccination antérieure contre le méningocoque C seule (délai de 1 mois minimum par rapport à la dernière vaccination MenC).

### ✓ **Recommandation** pour les **adolescents de 11 à 14 ans** avec ratrapage jusqu'à 24 ans révolus (1 dose)

## Méningocoque B (Bexsero®) :

### ✓ **Obligation vaccinale jusqu'à 24 mois :**

Schéma habituel : **3 mois, 5 mois, 12 mois.**

Ratrapage jusqu'à 2 ans (schéma en 2+1 doses)

### ✓ **À proposer et remboursé** pour les **15 à 24 ans révolus** : 2 doses espacées d'au moins 2 mois (6 mois dans l'idéal).

# Recommandations et obligations en 2025



**Renforcement des recommandations** de vaccination contre les **IIM face à l'épidémie 2024-2025** : le 24 avril 2025 communication du ministre de la Santé qui a décidé d'intensifier la stratégie vaccinale :

- 1) Rattrapage vaccinal ACWY et B recommandé de façon transitoire pour les jeunes **enfants jusqu'à 4 ans révolus (veille du 5e anniversaire)**.
- 2) Rattrapage contre le méningocoque B pour les 15 à 25 ans: cela va au-delà de ce qui était prévu dans le calendrier vaccinal 2025, où la vaccination B était simplement "proposée", avec remboursement.
- 3) Campagne de vaccination ACWY pour les 11-14 ans au collège à la rentrée 2025
- 4) Vaccination renforcée des 15-24 ans en ville, par les médecins, pharmaciens, sage-femmes et infirmiers.



# Vaccination

## ACYW

## B

|                                            |                                                                                        |                                                                                                   |                                                                                        |                                                                                        |                                                                                         |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Avant 12 mois</b>                       |  M6 |  M12           |  M3 |  M5 |  M12 |
| <b>De 12 à 24 mois</b>                     |                                                                                        |  1 seule dose  |     |     |      |
| <b>Jusqu'au 5<sup>e</sup> anniversaire</b> |                                                                                        |  1 seule dose  |     |     |                                                                                         |
| <b>De 5 à 11 ans</b>                       |                                                                                        |                                                                                                   |                                                                                        |                                                                                        |                                                                                         |
| <b>De 11 à 14 ans</b>                      |                                                                                        |  1 seule dose  |                                                                                        |                                                                                        |                                                                                         |
| <b>De 15 à 24 ans (rattrapage)</b>         |                                                                                        |  1 seule dose |    |    |                                                                                         |



Obligations



Recommandation



Rattrapage  
transitoire



Remboursé



AMM



# QUESTIONS RÉPONSES

**Merci**  
pour votre  
attention

