

Rougequeue à front blanc

(*Phoenicurus Phoenicurus*)





Carte d'identité



- **Poids** : 12 à 20 g
- **Longueur** : 14 cm
- **Envergure** : 23 à 26 cm
- **Alimentation** : principalement d'insectes et de larves, mais aussi des araignées et de petits fruits
- **Période de présence** :

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| | | | | | | | | | | | |
- **Écoutez le chant du Rougequeue à front blanc**

Comment le reconnaître ?



Mâles et femelles sont différents. La femelle présente un plumage plus discret que celui du mâle à l'exception de sa queue qui est aussi éclatante que celle du mâle.

Les jeunes ressemblent à la femelle lorsqu'ils partent du nid. En automne, les jeunes mâles ressemblent aux femelles mais ils présentent des plumes noires sur la gorge.

Habitat et aménagements du jardin

Le Rougequeue à front blanc est présent sur tout le territoire **d'avril à septembre**. Il peut être observé en reproduction ou en migration. C'est une espèce d'oiseaux inféodée aux arbres. Il apprécie **les boisements de feuillus et les vergers**. Le Rougequeue à front blanc niche en cavité. Il apprécie ainsi la présence de **vieux arbres**. Il peut ainsi utiliser **les nichoirs** posés à son intention sur un arbre ou sur un bâtiment.

Risques de confusion

Les **femelles et les jeunes** ressemblent beaucoup à ceux du **Rougequeue noir**. Cependant les parties inférieures du Rougequeue à front blanc sont toujours plus pâles que le dessus, là où elles sont d'un même gris chez le **Rougequeue noir**. Le **mâle de Rougequeue noir** présente un ventre gris-noirâtre bien différent de celui du Rougequeue à front blanc.



Rougequeue noir