

intermittente. — Type quotidien doublé. — Hôtel-Dieu, salle Saint-Landry, n° 60. — Moisson, âgé de 27 ans, serrurier, de constitution forte, éprouve quelquefois des maux de tête, des éblouissements, des bourdonnements dans les oreilles, et à plusieurs reprises il a perdu connaissance à la suite de ces accidents qui disparaissent toujours, lorsque une saignée lui est faite. — Il était, il y a huit mois, en garnison à Auxonne. La caserne qu'il habitait est sur le bord de la rivière, et la ville est entourée de marais. La fièvre intermittente y règne souvent, et une grande partie des soldats qui se trouvaient en garnison avec lui en ont été atteints. C'est pendant son voyage d'Auxonne pour venir à Paris qu'il a eu le premier accès de fièvre intermittente, après avoir été mouillé par la pluie. — Le frisson dura trois heures, et fut suivi de deux heures de chaleur. Moisson fut obligé de suspendre son voyage pendant deux jours. Les jours suivants, la fièvre revenait deux fois : 1° à 7 heures du matin; 2° à 6 heures du soir. Il existait en même temps une toux sèche, de la douleur à l'épigastre, des vomissements. A son arrivée à Paris, il y a sept mois, le malade entra à la Pitié; des sangsues furent appliquées à l'épigastre, et il sortit guéri au bout de trois semaines. La toux, la douleur épigastrique et les vomissements disparurent avec le frisson, et c'est depuis quinze jours que tous les accidents sont revenus avec le même type et aux mêmes heures que la première fois; la toux, la douleur à l'épigastre et les vomissements sont aussi reparus en même temps que les accès de fièvre. Etat actuel : 29 mars, soif assez vive; douleur à l'épigastre; vomissements; langue couverte d'un enduit blanchâtre, rouge à la pointe; rien à noter du côté des intestins; urines ordinaires; toux sèche; expectoration nulle; la sonorité et la respiration s'entendent dans toute la poitrine; les battements du cœur ont lieu dans une grande étendue; la percussion indique un cœur assez volumineux; il n'y a pas de bruits anormaux; il n'y a pas de douleur vers la région de la rate, elle offre 0^m,215 (8 p.) d'étendue de haut en bas, et 0^m,08 (3 p.) d'arrière en avant, avec de la dureté et de la résistance au doigt; le foie est volumineux. — Traitement : Sulfate de quinine, un gramme en deux doses. — 1^{er} avril : Au soir, très-léger mouvement fébrile avec des frissons; la rate est diminuée de haut en bas de 0^m,05 (près de 2 p.). — Continuation du traitement. — Le 2 : Pas de fièvre; dévoitement; diminution de 0^m,04 (1 p. 1/2) sur la hauteur de la rate. — Prescription : Suspension de sulfate de quinine; gomme. — Le 4 : Il n'y a eu ni accès ni frisson depuis avant-hier; la rate est sensiblement diminuée; elle conserve pourtant de l'épaisseur et de l'étendue; plus de dévoitement; pas de vomissements. — Prescription : Sulfate de quinine, 1^s,50; le quart d'aliments. — Le 7 : Le malade est tout

à fait bien; la rate a 0^m,095 (3 p. 1/2). — Sortie.

16. Fièvre intermittente. — Type quotidien. — Bronchite. — Hypersplénotropie. — Hôtel-Dieu, salle Saint-Landry, n° 54. — Le nommé Chanalu, imprimeur, âgé de 62 ans, avait toujours joui d'une santé parfaite et habitait une demeure saine près de la montagne Sainte-Genève, lorsqu'il fut obligé de travailler de son état à Saint-Denis, dans un local très-humide et dont le malade compare la disposition à celle d'une cave. Ce fut après trois semaines d'habitation dans ce séjour, qu'il éprouva il y a huit jours les symptômes suivants : Frissons qui durèrent une heure, et furent suivis de réaction fébrile avec chaleur et sueur; douleurs dans tous les membres; faiblesse avec étourdissement, pendant la station et la marche; toux assez fréquente avec expectoration peu abondante. — Ces derniers accidents ont persisté et le frisson se reproduit tous les jours, à 2 heures de l'après-midi, semblable au premier. — Etat actuel : 10 juin, Faciès de santé, quoique légèrement abattu; constitution robuste; langue rouge et sans enduit; peau un peu sèche; appétit normal; sonorité et élasticité des poumons; toux assez fréquente; crachats muqueux; respiration pure partout; dimensions du foie, 0^m,15, 0^m,11, 0^m,055 (5 p. 1/2, 4 p. et 2 p.). — La rate a 0^m,16 (près de 6 p.), elle est à 0^m,03 (1 p.) du rebord costal, non douloureux; intestins médiocrement sonores; pouls régulier et médiocrement développé; le cœur est assez volumineux, il ne présente pas de bruits anormaux; le malade se plaint d'avoir éprouvé quelques palpitations. — Prescription : Sulfate de quinine, 1 gramme en trois doses; infusion légère de camomille; le quart d'aliments. — Le 11 : La fièvre a manqué; diminution de la rate de 0^m,02 à 0^m,03 (environ 1 p.) sur chaque point de sa circonférence. — Même prescription. — Le 12 : Nouvelle diminution d'environ 0^m,015 (6 lignes) en tous sens. — Continuation. — Le 13 : Réduction de la rate à l'état normal; elle est ramenée à moins de moitié de son volume primitif. — Sortie.

17. Ancienne fièvre intermittente. — Nouvelle fièvre intermittente. — Type tierce. — Hypersplénotropie. — Hôtel-Dieu, salle Saint-Landry, n° 59. — Landry, âgé de 28 ans, soldat de la campagne d'Alger, y contracta les fièvres intermittentes. — Sa fièvre était tierce; elle avait lieu le matin. Il ne paraît pas qu'il ait souffert de la région de la rate. Il fut guéri par le sulfate de quinine. — Depuis son retour en France, il se portait bien lorsqu'il y a dix-huit jours la fièvre le reprit. Chaque accès avance de deux heures; le dernier a eu lieu cette nuit à deux heures. La fièvre dure deux heures et demie. — Etat actuel (18 mars), sept heures du matin : Langue humide, large;

Une observation de fièvre contractée à Auxonne dans les années 1840

Tiré de A. PIORRY
Traité de médecine pratique, tome V
Paris, Baillière, 1845

Document publié par Chantecler
Décembre 2017