



V

-  Recommandations générales
-  Recommandations particulières
-  Rattrapage

Lorsqu'un retard est intervenu dans la réalisation d'un programme de vaccination, il n'est pas nécessaire de le recommencer. Il suffit de le reprendre au stade où il a été interrompu et de compléter la vaccination.



CALENDRIER DES VACCINATIONS 2016



ÂGE

Naissance

2 mois

4 mois

11 mois

12 mois

16-18 mois

2 ans

6 ans

11-13 ans

14 ans

15-19 ans

20-72 ans

≥ 25 ans

45 ans

≥ 65 ans

ÂGE

ÂGE

ÂGE

NOTES APPELÉES AU VERSO

*(Les vaccins indiqués en italique
ne sont proposés que pour des risques spécifiques.)*

- 1. Enfants nés de mère **AgHBs** positif:** vacciner selon un schéma à 3 doses à débiter dans les 24 heures qui suivent la naissance; 1^{re} dose administrée avec des immunoglobulines anti-HBs. *Guyane et Mayotte: vaccination recommandée dès la naissance pour tous les enfants. 2^e et 3^e doses à M2 et M11.*
- 2. BCG par voie intradermique recommandé pour les enfants à risque élevé de tuberculose, si possible à la naissance ou au cours du 1^{er} mois de vie.** *La vaccination peut être réalisée jusqu'à 15 ans.*
- 3. Tous les enfants: 3 doses de vaccin Hexavalent **DTCaPHiVBH** (M2, M4, M11). Rappel DTCaP à 6 ans.**
- 4. VHB pour les enfants jusqu'à 15 ans inclus.** Vaccination du nourrisson: vaccin Hexavalent à M2, M4, M11. Vaccin monovalent: intervalle entre 2^e et 3^e dose d'au moins cinq mois.
- 5. Vaccin pneumococcique conjugué (**VP13**)** à partir de 2 mois pour tous les enfants (M2, M4, M11). En rattrapage de 12 à 23 mois, 2 doses à au moins deux mois d'intervalle. *Pour les prématurés et les nourrissons à risque, 3 injections à un mois d'intervalle à partir de l'âge de 2 mois, suivies d'un rappel à 11 mois.*
- 6. Vaccination annuelle contre la **grippe**:** enfants à partir de 6 mois, adolescents et adultes, atteints de pathologies spécifiques. Personnes obèses (IMC ≥ 40). Femmes enceintes quel que soit le trimestre de grossesse. Personnes séjournant en institution quel que soit leur âge.
- 7. **ROR**:** 2 doses pour tous les enfants. 1^{re} dose à 12 mois, 2^e dose entre 16 et 18 mois.
- 8. **MnCC**:** 1 dose de vaccin anti-méningocoque C conjugué pour tous les enfants de 12 mois et en rattrapage jusqu'à 24 ans inclus.
- 9. Vaccination contre les infections à méningocoques **ACYW** et vaccination contre les infections à méningocoque **B**:** personnes atteintes de pathologies spécifiques ou dans des situations particulières (voir calendrier vaccinal).
- 10. Hépatite **A (VHA)**:** enfants (à partir de 1 an) vivant en institution, patients porteurs de certaines maladies chroniques et personnes appartenant à des groupes exposés. Une dose de vaccin.
- 11. **Varicelle**:** adolescents de 12 à 18 ans, femmes en âge de procréer, sans antécédent clinique de varicelle ou histoire douteuse; adultes exposés, sans antécédent, dans les trois jours qui suivent l'exposition; personnes à partir de 12 mois sans antécédent ou séronegatives en contact avec des personnes immunodéprimées. Test de grossesse négatif préalable et contraception un mois après chaque dose de vaccin. Schéma à 2 doses.
- 12. Vaccin pneumococcique conjugué **VP13**** pour les enfants à risque de 24 à 59 mois, non vaccinés: 2 doses à deux mois d'intervalle, suivies d'1 dose de vaccin polysidique non conjugué 23-valent (**VP23**). Les enfants à risque ayant

déjà reçu au moins 2 doses de **VP13** avant l'âge de 24 mois ne reçoivent qu'1 dose de **VP23**.

- 13. **ROR**:** 2 doses espacées d'un mois, 1 dose pour les personnes nées depuis 1980 ayant déjà reçu une dose.
- 14. Enfants âgés de plus de 5 ans et adultes présentant un risque élevé d'IIP: 1 dose de **VP23**.** Enfants âgés de 5 ans et plus, adolescents et adultes immunodéprimés, atteints de pathologies spécifiques: 1 dose de **VP13**, suivie deux mois plus tard d'1 dose de **VP23**. Pour ceux qui ont été vaccinés depuis plus de trois ans avec le **VP23**, 1 dose de **VP13**, suivie huit semaines plus tard d'1 dose de **VP23**.
- 15. Infections à papillomavirus (**HPV**)** pour toutes les jeunes filles de 11 à 14 ans. Schéma à 2 doses espacées de six mois.
- 16. En rattrapage, vaccin **HPV**** pour les jeunes filles et jeunes femmes de 15 à 19 ans inclus, schéma à 3 doses.
- 17. À 11-13 ans, rappel avec un vaccin **dTcaP**,** à dose réduite en anatoxines diphtérique et coquelucheuse.
- 18. **VHB**** pour les adolescents de 11 à 15 ans inclus non vaccinés et si absence de risque élevé d'infection, schéma à 2 doses espacées de six mois.
- 19. **VHB**** pour les personnes exposées au risque: schéma à 3 doses (M0, M1, M6). Schéma accéléré possible en 3 doses à J0, J7 ou J10 (selon le vaccin), J21, suivies impérativement d'un rappel douze mois plus tard.
- 20. **dTcaP**** chez les personnes de 25 ans n'ayant pas reçu de vaccin coquelucheux depuis plus de cinq ans et rattrapage possible jusqu'à 39 ans révolus. *Au-delà de 25 ans, 1 dose de rappel dTcaPolio recommandée chez l'adulte antérieurement vacciné contre la coqueluche depuis plus de dix ans, à nouveau en situation d'être en contact avec des nourrissons âgés de moins de 6 mois (coconging).*
- 21. **ROR**** pour les jeunes femmes en âge de procréer non vaccinées et nées avant 1980. Si sérologie rubéole prénatale négative ou inconnue, pratiquer immédiatement la vaccination après l'accouchement, de préférence avant la sortie de la maternité ou au plus tôt après la sortie.
- 22. Rappels d'**dTP**** (dose réduite en anatoxine diphtérique) à 45 ans et 65 ans, puis tous les dix ans à partir de 75 ans.
- 23. Vaccination contre la **grippe**** tous les ans.
- 24. **Zona**:** 1 dose de vaccin chez les personnes âgées de 65 à 74 ans inclus.

Pour accéder au calendrier complet des vaccinations:
www.sante.gouv.fr



Rel. 31/15-4546-D0