Centre de Lutte Anti Tuberculeuse des Côtes d'Armor

CLAT 22

Le CLAT

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 17h sur RDV

- Pneumologues (1ETP)
 - Dr Eric BRIENS
 - Dr Marion GORY-BOUILLY
 - Dr Gwénaëlle LE GARFF
 - Dr Guillaume LEVEILLER
- Cadre de Santé (0,1ETP)
 - Catherine LAISNE
- Infirmières (2ETP)
 - Sophie ELLIS-CORBET
 - Sylvie LE BECHEC
- Secrétaires (1ETP)
 - Sandrine AVENEL
 - Nathalie BINARD
- Référents Pédiatrie
 - Dr Michel DAGORNE, pneumo pédiatre
 - Christine LE MINTIER, puéricultrice

Les missions du CLAT

Depuis 2008, le CLAT est missionné par l'ARS pour mettre en place la LAT

- Dépistage autour des cas déclarés
- Dépistage de population à risque
- Aide au suivi à la bonne observance des personnes sous traitement anti-tuberculeux
- Développer les partenariats
- Informer et former les professionnels de la santé
- Assurer la veille sanitaire
- Assurer la gratuité du dépistage au CLAT

Quelques données épidémiologiques sur la Tuberculose

Incidence de la Tuberculose au niveau national, régional et départemental (taux/100 000 H) source Invs

Nombre de cas de Tuberculose déclarés en Côtes d'Armor

Nombre de Déclaration Tuberculose et ITL de 2008 à 2017 par classe d'âge - CLAT22

Répartition des cas de tuberculose par nationalité - CLAT22

Tuberculose par territoire sur le 22 - Moyenne des cas et taux pour 100 000 h entre 2016 et 2017 CLAT22

Résultats du dépistage

Dépistage autour d'un cas

Selon les recommandations pratiques du Haut Conseil de la Santé Publique du 25/10/2013

Rappel des différentes étapes

- La DO : selon les critères de notification sont à déclarer :
Tuberculose confirmée ou suspectée avec TTT
d'épreuve, ITL des - de 15 ans
DO indispensable : si pas de DO = pas d'enquête
possible par le Clat +++
- Levée de l'anonymat auprès du médecin déclarant avec recueil d'infos administratives et médicales,
- Entretien d'enquête auprès du CI, pour établir la liste des personnes exposées (milieu familial, amical, de travail, de collectivité...),
- Identification des SC à dépister, et les médecins du travail concernés
- Organiser le dépistage avec les médecines du travail
- Note à l'ARS pour toutes collectivités sensibles
- Information et Rétro information des différents professionnels de santé

Etape 1 = entretien avec le cas index

- Le plus rapidement possible, idéalement quand le patient est encore hospitalisé
 - Nécessité d'un accord éclairé du patient pour identification des sujets exposés
- 1) information du patient (maladie, contagiosité, risque de contamination)
 - 2) identification des sujets exposés
 - 3) évaluation des freins au bon déroulement de l'enquête et du suivi de bonne observance thérapeutique

Étape 2: évaluer le risque de transmission chez les sujets contacts

- Facteurs de contagiosité accrue du cas index
- Facteurs d'expositions/d'environnement
- Facteurs de vulnérabilité à la tuberculose des personnes exposées

Critères de contagiosité du CI

- La localisation respiratoire • 1
- Présence de lésions étendues sur la RP • 1
- Présence de cavernes à la RP • 1
- Examen Direct positif (ED+) • 1
- La toux • 1
- Score • /5

Étape 2: évaluer le risque de transmission chez les sujets contacts

- Facteurs de contagiosité accrue du cas index
- Facteurs d'expositions/d'environnement
- Facteurs de vulnérabilité à la tuberculose des personnes exposées

Facteurs d'exposition / environnement

- Intensité
 - Dépend de la proximité des contacts (même pièce ou domicile)
 - Confinement = >1 personne/pièce d'habitation
 - Proximité (manœuvres à risque/ kiné respi, nébulisation, fibro et aspirations bronchiques, intubation...)
- Durée
 - Cumul des temps de contacts avec le cas index sur la période de contagion
 - >8h si BAAR +
 - > 40h si BAAR - avec culture +

Étape 2: évaluer le risque de transmission chez les sujets contacts

- Facteurs de contagiosité accrue du cas index
- Facteurs d'expositions/d'environnement
- Facteurs de vulnérabilité à la tuberculose des personnes exposées

Facteurs de vulnérabilité

- âge extrêmes de la vie:
 - < 5 ans et >75 ans,
- Immunodépression due
 - A certaines maladies (VIH, diabète, hémodialyse, cancer...)
 - À certain traitement immunosuppresseur (corticoïdes, anti TNF Alpha...)
 - A certaines problématiques de santé (dénutrition, toxicomanie, alcoolisme, tabagisme...)

Étape 3 : établir la liste des sujets contacts à dépister

- Définir les priorités = Identifier les sujets et les classer
- Cercle 1 = CONTACTS ETROITS
 - Personnes vivant sous le même toit et personnes proches (amis, collègues, soignants) qui ont passé un temps prolongé ensemble
 - >8h BAAR+, >40h BAAR- culture +

Si forte contamination du 1^{er} cercle, dépister le 2^{ème} cercle

- Cercle 2= CONTACTS REGULIERS ET/OU OCCASIONNELS
 - Personnes ayant fréquenté le cas index mais moins longtemps ou de manière moins rapprochée: amis, famille mais ne vivant pas sous le même toit, collègues, camarades de sport

Le dépistage

- Dépistage des personnes > 5 ans et immunocompétents
- Dépistage des enfants < 2 ans ou SC immunodéprimés
- Dépistage des enfants de 2 à 5 ans,

Dépistage des SC $\geq$ à 5 ans, immunocompétents

Sans délai : radiographie pulmonaire,
consultation,

TM

Dépistage des SC $\geq$ à 5 ans, immunocompétents

Sans délai : radiographie pulmonaire,
consultation,

TM

Estimation du délai depuis le dernier
contact

< 8-12 semaines

Convocation à 8-12 semaines

$\geq$ 8-12 semaines

Quantiféron/IDR

Dépistage des SC $\geq$ à 5 ans, immunocompétent

Sans délai : radiographie pulmonaire,
consultation,

TM

Estimation du délai depuis le dernier
contact

< 8-12 semaines

Convocation à 8-12 semaines

$\geq$ 8-12 semaines

Quantiféron /IDR

Négatif

Stop suivi

Dépistage des SC $\geq$ à 5 ans, immunocompétent

Sans délai : radiographie pulmonaire,
consultation,

TM

Estimation du délai depuis le dernier
contact

< 8-12 semaines

Convocation à 8-12 semaines

$\geq$ 8-12 semaines

Quantiféron/IDR

Positif

Négatif

Traitement

Stop suivi

Dépistage des SC $\geq$ à 5 ans, immunocompétent

Sans délai : radiographie pulmonaire,
consultation,

TM

Estimation du délai depuis le dernier
contact

< 8-12 semaines

Convocation à 8-12 semaines

$\geq$ 8-12 semaines

Quantiféron/IDR

Positif

Négatif

Pas de
traitement

Traitement

12-24 mois :
cs + RP

Stop suivi

Dépistage des enfants < 2 ans ou personnes immunodéprimées

Idéalement dans les 2 semaines : radiographie
pulmonaire, consultation, IDR (<5ans) et/ou
quantiféron

Dépistage des enfants < 2 ans ou personnes immunodéprimées

Idéalement dans les 2 semaines : radiographie pulmonaire, consultation, IDR (<5ans) et/ou quantiféron

Positif

Traitement prophylactique pdt 3 mois avec suivi pédiatrique

Stop suivi

Dépistage des enfants < 2 ans

ou personnes immunodéprimées

Dépistage des enfants de 2 à 5 ans

(vaccinés ou non)

L'information

- Médecin de la collectivité (entreprises, collectivités locales, santé scolaire, de PMI...) = info sur les caractéristiques... + dépistage
- ARS en systématique si collectivité concernée
- Médecin traitant du CI = dépistage + rétro information
- Médecin déclarant = rétro information
- Médecin hospitalier pour informer le patient co-hosp et son médecin traitant

En résumé

- Déclaration à l'ARS et signalement au CLAT dès que possible (même si le CI est DCD) pour initier l'entretien d'enquête et débiter le dépistage
- Le dépistage
 - RP et consultation médicale le plus rapidement possible
 - Test immunologique :
 - IDR pour les enfants < 5 ans : immédiatement et à 3 mois
 - A 8 / 12 semaines du dernier contact : Test Quantiféron (> 5 ans) au CLAT ou IDR chez le médecin traitant
 - Si tout est normal, le dépistage s'arrête, sinon suivi spécifique organisé.

Dépistage ciblé des migrants primo- arrivants

Le dépistage des migrants venant de zone à forte endémie de tuberculose

Estimated TB incidence rates, 2014

Les modalités de dépistage

selon l'Avis du Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de la Santé du 30/09/2015 - Ministère de la Santé et des Solidarités

- Pour les + de 15 ans
 - Radio pulmonaire (s'assurer qu'il n'y est pas de grossesse et/ou RP récente)
- Pour les - de 15 ans
 - Test immunologique (Intra Dermo Réaction ou Quantiféron)
 - Enfant < 5 ans : IDR, réalisation 1 jour et lecture à 72h
 - Enfant > 5 ans : possible quantiféron, 1 prise de sang (au CLAT ou par le CLAT ou si ouverture de droit : prise en charge par la sécurité sociale)
- Les partenaires du secteur (Noz Deiz) contactent le CLAT
 - Transmission par mail ou fax des noms/prénoms/ddn/nationalité/adresse de domiciliation/date d'arrivée en France/langue parlée
 - Ordonnance de RP transmise au travailleur social pour prise de RDV auprès des services de radiologie secteur Dinan
 - Si une consultation au CLAT est nécessaire, l'interprétariat (ISM) par tel peut être utilisé

- Si radio anormale
 - Consultation avec le pneumologue au CLAT
 - Examens complémentaires si besoin
 - Si suspicion de tuberculose, hospitalisation à organiser
- Si test immunologique positif (- de 15ans)
 - Radio pulmonaire
 - Consultation avec le pneumo-pédiatre du CH de St-Brieuc
 - Traitement préventif pourra être mis en route
- Si tuberculose contagieuse diagnostiquée
 - Enquête d'entourage faite par le CLAT
 - Dépistage pour les personnes en contact avec le cas de tuberculose si besoin

Nos partenaires actuels

- CAT établie avec :
 - Noz Deiz
 - COALLIA
 - AMISEP
 - Centre d'Examen de Santé
 - Points santé d'ADALEA (+ personnes très marginalisées)
 - Conseil départemental (Mineurs non accompagnés)
 - SIMPPS (étudiants étrangers)

Dépistage des personnes primo-arrivantes par le CLAT22

Nombres de suivi		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
OFII	Cs	6	2	3	2	5	3	2	5	2
Dépistage primo-arrivants	RP	1	43	31	46	54	121	102	163	241
	Cs								6	26
Dont dépistage des mineurs	RP			20	28	27	37	-	54	33
	Test								18	38
	Total								72	71
Pathologie découverte										
Tuberculose		1	1	0	0	0	0	0	1	2
ITL < 15 ans									1	0
Suspicion de tuberculose		0	0	0	2	1	1		1	5
Images séquellaires		4		2	0	0	1		2	3
Autres		1	0	1	1	0	4		2	3

Depuis 5 ans, le nombre de suivi demandé est en constante augmentation pour arriver à 241 RP et 38 tests immunologiques en 2017. Les familles sont mieux adressées depuis notre travail de partenariat.

Quelques coordonnées

- www.hcsp.fr : recommandations
- www.santepubliquefrance.fr : épidémiologie et feuillet DO
- www.splf.org : liste des CLAT
- CLAT des Côtes d'Armor: 10 rue Marcel Proust 22000 St-Brieuc - tel: 02 96 01 78 15
- ARS: Centre Opérationnel de Réception et de Régulation des Signaux CORRSI, fax: 02.90.01.25.25 (pour faxer la DO)