



Clinique du Pays de Rance
Dinan

Périméologie


Incontinence & statique pelvienne

Date 21.09.2022

 VIVALTO SANTÉ


Rappels anatomiques

Pelvis masculin





Rappels anatomiques

Pelvis féminin



Rappels anatomiques


Plancher pelvien



- | | | | |
|--|---|---|--|
| a droite : muscles et ligaments sectionnés | 5 : arcade tendineuse du m. élévateur de l'anus | 10 : m. pubo coccygien | 14 : anus |
| 1 : urètre | 6 : m. ilio-coccygien | 11 : m. pubo-vaginal | 15 : faisceau rétro-anal (m. puborectal) |
| 2 : lig. arqué du pubis | 7 : lig. sacro-tubéral | 12 : centre tendineux du périnée | 16 : faisceau coccygien (m. puborectal) |
| 3 : lig. transverse du périnée | 8 : m. coccygien | 13 : faisceau latéro-rectal (m. puborectal) | |
| 4 : vagin | 9 : lig. sacro-épineux | | |

Rappels anatomiques

Sphincter urinaire féminin



Rappels anatomiques

Foramen obturé





FIG. 16.20. Articulation coxo-fémorale (vue antérieure)

1. tendon réfléchi du m. droit 5. canal du foramen obturé

Définitions

Colpocoele antérieure



- la saillie apparaissant sur la paroi antérieure du vagin, le plus souvent causée par la cystocoele.

Définitions


Colpocoele postérieure



- la saillie apparaissant sur la paroi postérieure du vagin, le plus souvent causée par une rectocoele.

Définitions


Cystocoele



- Une cystocèle est une hernie, d'une partie ou de la totalité de la vessie, y compris l'engagement de la vessie dans le vagin (colpocèle antérieur), se définit habituellement comme la descente de la vessie dans le vagin.

Définitions

Rectocele



- hernie formée par le prolapsus du rectum dans le vagin.

Définitions


Prolapsus anal



prolapsus du rectum à travers l'anوس, souvent lié à une insuffisance majeure du sphincter anal et à une incontinence fécale.

Définitions


Invagination ou intussusception du rectum



- prolapsus rectal une invagination endoluminale de toute ou partie de la paroi rectale (l'invagination naît le plus souvent à 8 cm de la marge anale à l'occasion d'un effort de poussée).

Définitions


Elytrocoele



- hernie du cul de sac de Douglas venant faire saillie dans la paroi vaginale postérieure.

Définitions

Entérocoele




- issue du grêle dans une élytrocoele



Définitions


Hystéroptose



- L'hystéroptose est la descente de l'utérus dans le vagin, due au relâchement de ses moyens d'immobilisation dans l'abdomen

Définitions


Hystéroptose



Hystéroptose est la descente de l'utérus dans le vagin, due au relâchement de ses ligaments d'immobilisation dans l'abdomen

Définitions



Classification de Baden



- **Stade I :** le prolapsus n'atteint pas l'orifice vulvaire.
- **Stade II :** le prolapsus atteint l'orifice vulvaire sans le dépasser.
- **Stade III :** le prolapsus est extériorisé.
- **Stade IV:** prolapsus totalement extériorisé

Définitions

Classification de Baden



- **Stade I :** le prolapsus n'atteint pas l'orifice vulvaire.
- **Stade II :** le prolapsus atteint sans le franchir.
- **Stade III :** le prolapsus est au niveau de l'orifice.
- **Stade IV :** le prolapsus est au-dessus de l'orifice.

Incontinence urinaire

Incontinence urinaire d'effort

caractérisée par une fuite involontaire d'urine, non précédée du besoin d'uriner, qui survient à l'occasion d'un effort tel que toux, rire, éternuement, saut, course, soulèvement de charges ou toute autre activité physique augmentant la pression intra-abdominale,

Incontinence urinaire par impériosité

caractérisée par la perte involontaire d'urine précédée d'un besoin urgent et irrépressible d'uriner aboutissant à une miction ne pouvant être différée

Incontinence urinaire mixte

**Merci,
de votre
attention.**



Clinique du Pays de Rance

Dinan



VIVALTO SANTÉ

Entre nous, la vie