

PROTOCOLES DES URGENCES

PROPOFOL AVANT PROCÉDURE DOULOUREUSE AUX URGENCES

Dr Légaut - MAJ Mai 2005

INSTALLATION

- Vérifier pas d'allergie à l'albumine
- Enlever prothèses dentaires
- Scope
- ECG
- Perfusion iv NaCl 500 mL 0,9 %
- O2 lunettes 2 L/min, ambu prêt à l'utilisation
- Préparer Propofol : 200 mg (20 mL)



SEDATION

- Propofol 1 mg/Kg ivd
- Noter heure d'injection
- Si nécessaire titration par doses de 0,5 mg/Kg ivd jusqu'à obtention de la sédation suffisante
- Réalisation du geste douloureux



SURVEILLANCE

- Scope pendant 30 min
- Noter TA Sat FR toutes les 5 min
- Noter heure de réveil
- Sortie autorisée accompagnée après 2h
- Présence au domicile la 1^{ère} nuit

Références :

1/ Ann Emerg Med 2005 ; 45(2) : 177-196 / 2007 ; 49(1) : 31-36 / 2007 ; 49(4) : 454-467

2/ C. Légaut, Ann. Fr. Med. Urgence (2011) 1:5-9. Sédation avec le propofol dans un service d'urgences. Étude prospective observationnelle