

Objet et domaine d'application

Ces Précautions Complémentaires complètent les « **Précautions Standard** » pour prévenir la transmission du *virus Monkeypox* par **contact direct** (mains), **gouttelettes** ou **indirect** (matériel, surfaces souillées).

Description

PRESCRIPTION PRELEVEMENT	Sur un écouvillon de virologie, percer la vésicule et prélever le liquide. Si lésion sèche, humidifier l'écouvillon et frotter 1 ou plusieurs lésions	
ENVOI PRELEVEMENT/ORDONNANCE/MAIL pour communication rapide résultat	Laboratoire CHU Paul Brousse Envoi de l'examen par Globe express : 0140096955 ou 0659675016	Résultat dans la journée
TRANSFERT PATIENT	Dans un centre de référence (Hôpital Salpêtrière, Kremlin Bicêtre, Bichat, Begin)	
DECLARATION ARS par mail Cerfa 12218	Ars75-alerte@sante.fr	
CHAMBRE	Seule jusqu'au transfert	
SIGNALEMENT	Affiche sur porte (Qualithèque n°) + Unité Mobile Information du patient	
HYGIENE DES MAINS	FHA	
GANTS A USAGE UNIQUE	Dès l'entrée en chambre pour les contacts des lésions	
PROTECTION DE LA TENUE	avant de rentrer dans la chambre	
MATERIEL	Dispositif réservé au patient (Si non réalisable : désinfection des surfaces avec Oxyfloor)	
BASSIN/URINAL /CHAISE PERCEE	Utiliser les sacs de protection pour bassins, urinaux, chaise percée à usage unique avec un tampon absorbant + désinfection du matériel	
DECHET	DASRI Dans la chambre	
LINGE	Drap et tenue manches longues à usage unique	
VAISSELLE	Vaisselle à usage unique	
BIO NETTOYAGE CHAMBRE/MATERIEL	OXYFLOOR : 1 sachet dans 5 l d'eau pour toutes les surfaces	
LEVEE DES PCCR	Levée de isolement quand disparition des dernières croutes (environ 3 semaines)	