



LEPIDOPTERA  
DIURNES



Ordre : **Lepidoptera**

Famille : **Papilionidae**

Nom latin : ***Battus polydamas***

Nom français : **Papillon Trèfle Caraïbe**

UICN : **LC - Préoccupation mineure**



## DESCRIPTION

- Grand papillon sombre de 75 à 87 mm d'envergure.
- Dessus des ailes noir pourvu d'une série de points blanc verdâtre.
- Dessous des ailes plus bariolé, fond noir avec bande blanchâtre sur les antérieures, et fond noir pourvu de taches rouges sur les postérieures.
- Corps noir tacheté de points rouges.

Classes  
de taille





Chenille



## RÉPARTITION MONDIALE

- Du sud des États-Unis d'Amérique jusqu'en Patagonie (Argentine et Chili).
- Aux Antilles, des sous-espèces sont présentes selon les îles.



## GUADELOUPE

- Sous-espèce *neodamas*.
- Peu commun.
- En Basse-Terre et en Grande-Terre.



## HABITAT

- Jardins, prairies, abords des forêts marécageuses et des routes forestières.
- Du niveau de la mer jusqu'en altitude.

Chez les Papilionidae, les chenilles gonflent leurs cornes pour intimider les prédateurs.



Plante-hôte *Aristolochia trilobata*



Plante-hôte *Aristolochia rugosa*



## PLANTE-HÔTE Chenille

- Famille des Aristolochiacées (lianes) dont le Trèfle Caraïbe *Aristolochia trilobata* et *Aristolochia rugosa*.



## COMPORTEMENT

- Généralement solitaire.
- Vol puissant et rapide.
- Passe vivement de fleur en fleur.

## Références bibliographiques

Brévignon C. & L. Brévignon. 2003. À la découverte des papillons diurnes des Antilles. PLB éditions, Gosier, Guadeloupe, FRANCE. 64 pages.

David G. & P.-D. Lucas. 2017. Atlas des papillons de jour de la Martinique. Association Martinique Entomologie. 139 pages.

David G. & B. Thiébaud. 2012. Les plantes-hôtes des papillons de jour des Antilles françaises. Société d'Histoire Naturelle L'Herminier. 28 pages.

UICN Comité français, OFB & MNHN. 2021. La Liste rouge des espèces menacées en France – Chapitres Faune de Guadeloupe. Paris, France. 36 pages.